

血糖コントロール目標

コントロール目標値（HbA1c 値）			
	血糖正常化を目指す際の目標	合併症予防のための目標	治療強化が困難な際の目標
HbA1c (%)	6.0%未満	7.0% 未満	8.0%未満

参考：日本糖尿病学会 編・著：糖尿病治療ガイド 2024

65歳以上の糖尿病高齢者の血糖コントロール目標

患者の特徴・健康状態	カテゴリー 1		カテゴリー 2	カテゴリー 3
	1 認知機能正常かつ 2 ADL 自立		1 軽度認知障害～軽度認知症または 2 手段的 ADL 低下、 基本的 ADL 自立	1 中等度以上の認知症または 2 基本的 ADL 低下または 3 多くの依存疾患や機能障害
重症低血糖が危惧される薬剤(インスリン製剤、S U 剤、グリニド薬などの使用)	なし	7.0%未満	7.0% 未満	8.0%未満
	あり	65歳以上 75歳未満 7.5%未満 (下限 6.5%)	75歳以上 8.0%未満 (下限 7.0%)	8.0% 未満 (下限 7.0%) 8.5%未満 (下限 7.5%)

参考：日本老年医学会・日本糖尿病学会 編・著：高齢者糖尿病診療ガイドライン 2023